




GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

AEMet
Agencia Estatal de Meteorología

Palma de Mallorca,
22-24 octubre 2008

into
innovation
& tourism
international
seminar



Cambio climático: situación actual

E. Rodríguez Camino
AEMet

Contenido

- ” ¿Qué es el IPCC?
- ” ¿Cuánto cambio climático se ha observado?
- ” ¿En qué medida es atribuible a actividades humanas?
- ” ¿Cuáles serán las proyecciones futuras del clima?
- ” Cambio en los sistemas biofísicos
- ” Sectores y sistemas especialmente afectados
- ” Adaptación para reducir los impactos
- ” Potencial de mitigación mediante diferentes tecnologías y actuaciones

¿Qué es el IPCC?

- ” Creado en 1988 por dos organizaciones de la ONU: OMM y PNUMA para evaluar **%el riesgo del cambio climático inducido por el hombre+**. El IPCC está abierto a todos los miembros de OMM y PNUMA.
- ” El IPCC es **%neutro+** con respecto a la política
- ” Objetivos:
 - . Evaluar la información científica sobre CC
 - . Evaluar los impactos del CC
 - . Formular estrategias de respuesta

¿Qué hace el IPCC?

- “ Revisa y evalúa la información científica, técnica y socio-económica más reciente relevante a la comprensión del CC.





2500+ scientific expert reviewers
800+ contributing authors and
450+ lead authors from
130+ countries
6 years work
4 volumes
1 Report

- “ Genera a intervalos regulares (5-6 años) informes detallados y rigurosamente documentados que resumen el conocimiento actual y las futuras proyecciones del CC

¿Cómo trabaja el IPCC?

- “ 3 grupos de trabajo:
 - . base científica física
 - . impactos, adaptación y vulnerabilidad
 - . mitigación
- “ Revisión → parte esencial que asegura evaluación completa y objetiva de la información disponible
- “ Revisores expertos y gobiernos comentan los temas científicos y técnicos
- “ Amplia circulación
- “ Puntos de vista diferentes aparecen reflejados en los documentos.



Vision of UN Secretary-General on Climate Change

- "Climate change is a serious threat to development everywhere"
- "Today, the time for doubt has passed. The IPCC has unequivocally affirmed the warming of our climate system, and linked it directly to human activity"
- "Slowing or even reversing the existing trends of global warming is the defining challenge of our ages"
- "Galvanising international action on global warming as one of main priorities as Secretary General"



INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)




■




INTO

Valencia, 17-11-2007

Schematic framework of anthropogenic climate change drivers, impacts and responses



Sistema climático




¿Existe el CAMBIO CLIMATICO?

El **calentamiento del sistema climático es inequívoco**,


tal y como se evidencia de las observaciones del incremento de las temperaturas globales medias del aire y del océano, de la fusión de las nieves y hielos y de la elevación global del nivel medio del mar

(IPCC-AR4 *dixit*)




INTO 22

Changes in Temperature , Sea Level and Northern Hemisphere Snow Cover




Temperaturas globales

Los 12 años más cálidos:
1998, 2005, 2003, 2002, 2004, 2006,
2001, 1997, 1995, 1999, 1990, 2000



EL CLIMA ESTÁ EN PERMANENTE EVOLUCIÓN!!



Todo cambia, nada permanece.

“No podemos bañarnos dos veces en el mismo río”.



Heráclito de Éfeso (siglo V, a.C)

Cambio de temperaturas en España

Brunet et al. 2006






Tabla 2.1.- Tendencias anuales y estacionales de las temperaturas diarias (en °C/década) junto a sus intervalos de confianza al 95% calculadas para diversos períodos. En negrita (italica) coeficientes significativos al 1% (5%).

| Periodos | 1850-2005 | 1901-2005 | 1901-1949 | 1950-1972 | 1973-2005 |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Temperaturas medias diarias | | | | | |
| Anual | 0.10 (0.08/0.12) | 0.13 (0.10/0.16) | 0.22 (0.11/0.31) | -0.19 (-0.53/0.12) | 0.48 (0.36/0.66) |
| Invierno | 0.10 (0.07/0.14) | 0.14 (0.08/0.20) | 0.10 (-0.08/0.32) | 0.11 (-0.58/0.68) | 0.27 (-0.09/0.56) |
| P <small>rimavera</small> | 0.08 (0.05/0.12) | 0.12 (0.06/0.17) | 0.25 (0.06/0.43) | -0.52 (-1.03/0.05) | 0.77 (0.54/0.97) |
| V <small>erano</small> | 0.09 (0.06/0.11) | 0.13 (0.08/0.18) | 0.23 (0.07/0.38) | -0.29 (-0.71/0.13) | 0.67 (0.41/0.92) |
| O <small>toño</small> | 0.10 (0.07/0.13) | 0.12 (0.08/0.17) | 0.26 (0.09/0.42) | -0.08 (-0.57/0.53) | 0.29 (0.02/0.58) |
| Temperaturas máximas diarias | | | | | |
| Anual | 0.11 (0.09/0.14) | 0.17 (0.13/0.21) | 0.37 (0.25/0.46) | -0.28 (-0.74/0.16) | 0.51 (0.34/0.66) |
| Invierno | 0.12 (0.09/0.15) | 0.16 (0.10/0.21) | 0.18 (-0.02/0.36) | -0.04 (-0.61/0.62) | 0.35 (0.06/0.60) |
| P <small>rimavera</small> | 0.11 (0.06/0.15) | 0.17 (0.11/0.23) | 0.37 (0.16/0.60) | -0.62 (-1.38/0.09) | 0.82 (0.53/1.15) |
| V <small>erano</small> | 0.10 (0.06/0.13) | 0.18 (0.12/0.24) | 0.44 (0.27/0.64) | -0.30 (-0.88/0.17) | 0.73 (0.43/1.04) |
| O <small>toño</small> | 0.12 (0.09/0.15) | 0.17 (0.10/0.22) | 0.44 (0.26/0.64) | -0.12 (-0.84/0.70) | 0.13 (-0.17/0.47) |
| Temperaturas mínimas diarias | | | | | |
| Anual | 0.08 (0.06/0.10) | 0.09 (0.06/0.12) | 0.08 (-0.02/0.18) | -0.13 (-0.51/0.14) | 0.47 (0.31/0.65) |
| Invierno | 0.09 (0.06/0.13) | 0.12 (0.05/0.19) | 0.06 (-0.15/0.24) | 0.15 (-0.56/0.78) | 0.06 (-0.28/0.62) |
| P <small>rimavera</small> | 0.07 (0.04/0.09) | 0.08 (0.03/0.13) | 0.15 (0.01/0.31) | -0.19 (-0.72/0.29) | 0.66 (0.46/0.84) |
| V <small>erano</small> | 0.08 (0.05/0.10) | 0.09 (0.04/0.13) | 0.00 (-0.13/0.14) | -0.26 (-0.60/0.08) | 0.62 (0.38/0.93) |
| O <small>toño</small> | 0.08 (0.05/0.11) | 0.08 (0.04/0.13) | 0.09 (-0.06/0.25) | -0.13 (-0.41/0.33) | 0.43 (0.18/0.77) |

Cambios en sistemas físicos y biológicos y temperatura en superficie 1970-2004



* Polar regions include also observed changes in marine and freshwater biological systems

** Marine and freshwater includes observed changes at sites and large areas in oceans, !

*** Circles in Europe represent 1 to 7500 data series.

(AR4, 2007)





Figure 6A.6: Landsat satellite image of Jakobshavn Isbrae and its fjord, showing locations of the calving ice front in years from 1851 to 2006. The glacier extends through the Ilulissat Icefjord, surrounded by mountains. Icebergs calve off from the main glacier, pile up and block the fjord before being released into Qeqertarsuup Tunua (Disko) Bay and Davis Strait. The whiter areas in the fjord are piled-up icebergs and the "real" glacier ends where the greyish striped section ends – showing that this image is from 2001. The graph shows glacier-velocity profiles for 1985 to 2006. During this period Jakobshavn Isbrae, already the world's fastest glacier, doubled its speed to almost 14 km per year^{28,29} after rapid thinning and break up of its floating ice tongue³¹.

Sources: NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio. Historic calving front locations courtesy of Anker Weidick and Ole Bennike
Source: based on Howatt and others 2007



AUMENTO CONTINUO CO₂







Figura 4.4. Los flujos (representados por flechas) están en Pg (10^{15} g) C año⁻¹ y los reservorios (representados por cajas) en Pg C. Las flechas y cifras en negro representan el ciclo natural y las flechas y cifras en rojo representan la alteración de los flujos y reservorios por la actividad humana.

INTO 22/10 Perturbación del ciclo del carbono!!



Modelos numéricos para clima





Fig. 2.- Componentes del sistema climático que se han ido añadiendo en la formulación de los AOGCMs, desde los modelos puramente atmosféricos que se utilizaban en los años 70 a los de última generación que constan de ocho componentes fuertemente acoplados entre sí (fuente: IPCC, 2001).


Atribucion: causas del calentamiento global

- “ Son los cambios observados consistentes con
- Respuestas esperadas a forzamientos
- Inconsistentes con las explicaciones alternativas



Comprensión y atribución del cambio climático

Calentamiento continental probablemente muestra una significativa contribución antropogénica en los pasados 50 años




CAMBIO CLIMATICO MUY PROBABLEMENTE (90%) DE ORIGEN ANTROPOGENICO (AR4)

¿Quién es el principal responsable del cambio climático?

Greenhouse Gases

The University of Eastgate
M The Leedham Trust
Produced by the S&S group (Gifford) and Mark Rasmussen (Michigan)



Greenhouse gases trap heat in the earth's atmosphere, causing it to warm up. The greenhouse gases shown here are carbon dioxide, methane and nitrous oxide. These gases account for 98% of the greenhouse effect. Other greenhouse gases, not shown here, are various fluorocarbons and sulphur hexafluoride.

The territories that emit the most greenhouse gases are the United States, China, the Russian Federation and Japan. However, the most emissions per person are in Qatar: equivalent to 86 tonnes of carbon dioxide per year. Qatar has significant oil and gas reserves, and in 2002 was populated by 600,000 people.

Territory size shows the proportion, by their global warming potential, of all greenhouse gas emissions that come from there.




Technical notes
• Data are from the United Nations Statistics Division, 2003.
• *Greenhouse gases measured in equivalent tonnes of carbon dioxide based on global warming potential. Not recorded as 0 in source data.
• See website for further information.

MOST AND LEAST GREENHOUSE GAS EMISSIONS

| Rank | Territory | Value | Rank | Territory | Value |
|------|----------------------|-------|------|--------------------------|-------|
| 1 | Qatar | 36 | 191 | Mozambique | 0.18 |
| 2 | Jamaica | 45 | 192 | Eritrea | 0.18 |
| 3 | Bahrain | 37 | 193 | Madagascar | 0.18 |
| 4 | Kuwait | 27 | 194 | United Republic Tanzania | 0.18 |
| 5 | Luxembourg | 27 | 195 | Liberia | 0.16 |
| 6 | Australia | 27 | 196 | Sierra Leone | 0.17 |
| 7 | Brunei Darussalam | 26 | 197 | Nepal | 0.11 |
| 8 | Paraguay | 25 | 198 | Afghanistan | 0.05 |
| 9 | United Arab Emirates | 25 | 199 | Marshall Islands | 0.05 |
| 10 | United States | 23 | 200 | Niue | 0.00 |

tonnes of greenhouse gases emitted per person per year in 2002*

GREENHOUSE GAS EMISSIONS




"Now during high tides, the water comes right across the ground, where the houses are, and it never happened before..."

Elia Taita, 2002

Map 200

Emisiones de CO₂ en 2002



Es muy difícil imaginar cuánto es una tonelada de CO₂, ¿me puedes un ejemplo?




En un viaje en avión de Madrid a Londres las emisiones por persona (viaje de ida y vuelta) son de casi una tonelada de CO₂. En coche, emitimos aproximadamente una tonelada de CO₂ por cada 5000 Km recorridos. Una tonelada de CO₂ es por otra parte, la emisión anual media de una persona en países como Mozambique.



Calcula tus emisiones de CO₂:
<http://www.ceroco2.org/>

Concentración de CO₂ en la atmósfera

Year 2007
Atmospheric CO₂
concentration:
382.6 ppm
35% above pre-industrial




| | |
|--------------|------------------------------------|
| 1970 - 1979: | 1.3 ppm y^{-1} |
| 1980 - 1989: | 1.6 ppm y^{-1} |
| 1990 - 1999: | 1.5 ppm y^{-1} |
| 2000 - 2006: | 1.9 ppm y^{-1} |

Destino de las emisiones antropogénicas de CO₂ (2000-2006)




+




Canadell et al. 2007, PNAS

Inercia del sistema climático




Necesidad de estrategias de adaptación!!

Proyecciones de cambios futuros en el clima



- * Mejor estimación para escenario bajo (B1) es 1.8°C (rango probable 1.1-2.9°C), y para escenario alto (A1FI) es 4.0°C (rango probable 2.4-6.4°C).
- * Dos próximas décadas aprox. 0.2%/década para muchos de los SRES
- * Proyecciones para las próximas décadas son insensibles a la elección del escenario
- * Proyecciones a largo plazo dependen del escenario y de la sensibilidad de los modelos climáticos

Más/menos lluvia en latitudes altas/bajas



(AR4, 2007)

Precipitación **aumenta** muy probablemente in latitudes altas

Decrece probablemente en la mayoría de las regiones terrestres subtropicales

INTO 22/10/2008


23


Cambio (%) en escorrentía

[2090-2099 respecto a 1980-1999]


Ensemble basado en escenario SRES A1B

Projected relative changes in runoff by the end of the 21st century






BALEARES




BALEARES



8


Media móvil de 10 años

BALEARES




Impactos proyectados por sectores

0.6° comprometidos 2.0° (pre-ind.)



Impactos proyectados por regiones



Algunos sistemas y sectores son muy vulnerables

- “ Algunos ecosistemas:
 - . Barreras de coral; regiones de hielos marinos
 - . Tundra, bosques boreales, montañas y regiones Mediterraneas
- “ Regiones costeras bajas, manglares y zonas inundadas marinas
- “ Recursos hídricos en latitudes medias y trópicos secos
- “ Agricultura en bajas latitudes
- “ Salud humana donde la capacidad de adaptación es baja

Algunas regiones resultarán más afectadas que otras



- ” El Ártico
- ” África Sub-Sahariana
- ” Islas pequeñas
- ” Megadeltas asiáticos

Impacts of climate change in Europe: PESETA proj.

(<http://peseta.jrc.ec.europa.eu>)

Simulated conditions for summer tourism in Europe for 1961-1990 (left) and 2071-2100 (right) according to a high-emissions scenario (IPCC A2) , map elaboration by EC JRC/IES.

The climatic suitability for general summer tourism purposes can be expressed as an index, the Tourism Climate Index (TCI), comprising the climate features **temperature, humidity, sunshine, rain and wind**. Monthly climate data were used with a spatial resolution of 12 km. A TCI value was computed, and subsequently aggregated to seasons. The maps represent summer conditions (June, July, August).




- “ Los impactos del cambio climático afectarían, en primer lugar, al **espacio geográfico-turístico**, y pueden producir alteraciones en los ecosistemas, ya en condiciones de alta fragilidad, dejando de reportar los beneficios sociales, económicos y ambientales disfrutados hasta el momento.
- “ La **escasez de agua** provocaría problemas de funcionalidad o viabilidad económica de ciertos destinos. El **incremento de las temperaturas puede modificar los calendarios de actividad**, aumentando los viajes en las interestaciones. La elevación del nivel del mar amenazaría la **localización actual de determinados asentamientos turísticos** y de sus infraestructuras.
- “ Los turistas pueden disminuir la estancia media en cada destino, retrasar el momento de la decisión **del viaje** y **cambiar la dirección de sus visitas hacia otros lugares**: los turistas extranjeros quedándose en sus propios países y los nacionales con desplazamientos hacia las costas del norte o el interior.



¿A qué nivel deben estabilizarse los GEI en la atmósfera para no comprometer serias interferencias en el sistema climático y no comprometer la paz y seguridad?

| Category | CO ₂ concentration at stabilization (2005 = 379 ppm) ^(b) | CO ₂ -equivalent Concentration at stabilization including GHGs and aerosols (2005 = 375 ppm) ^(b) | Peaking year for CO ₂ emissions ^(a, c) | Change in global CO ₂ emissions in 2050 (% of 2000 emissions) ^(a, d) | Global average temperature increase above pre-industrial at equilibrium, using "best estimate" climate sensitivity ^(d, e) | Global average sea level rise above pre-industrial at equilibrium from thermal expansion only ^(f) | Number of assessed scenarios |
|----------|---|---|--|--|--|--|------------------------------|
| | ppm | ppm | Year | Percent | °C | metres | |
| I | 350 – 400 | 445 – 490 | 2000 – 2015 | -85 to -50 | 2.0 – 2.4 | 0.4 – 1.4 | 6 |
| II | 400 – 440 | 490 – 535 | 2000 – 2020 | -60 to -30 | 2.4 – 2.8 | 0.5 – 1.7 | 18 |
| III | 440 – 485 | 535 – 590 | 2010 – 2030 | -30 to +5 | 2.8 – 3.2 | 0.6 – 1.9 | 21 |
| IV | 485 – 570 | 590 – 710 | 2020 – 2060 | +10 to +60 | 3.2 – 4.0 | 0.6 – 2.4 | 118 |
| V | 570 – 660 | 710 – 855 | 2050 – 2080 | +25 to +85 | 4.0 – 4.9 | 0.8 – 2.9 | 9 |
| VI | 660 – 790 | 855 – 1130 | 2060 – 2090 | +90 to +140 | 4.9 – 6.1 | 1.0 – 3.7 | 5 |



1970 – 1979: 1.3 ppm y⁻¹
1980 – 1989: 1.6 ppm y⁻¹
1990 – 1999: 1.5 ppm y⁻¹
2000 - 2006: 1.9 ppm y⁻¹

Costes de la mitigación

- ” Los costes macroeconómicos de la mitigación crecen generalmente con la exigencia del nivel de estabilización
- ” En 2050, los costes macroeconómicos globales medios para estabilización entre 710-445 ppm CO₂-eq están entre +1% y -5% del PIB
- ” El PIB anual global se reducirá menos de 0.12%

Equity Issues

- **Africa by 2020:**
 - Between 75 & 250 million people projected to be exposed increased water stress
 - In some countries, yields from rain-fed agriculture would be reduced by 50%
- **Asia by 2050s:**
 - Freshwater availability is projected to decrease
 - Coastal areas, especially heavily-populated mega delta regions will be greatest risk from sea flooding
- **Small Island States:**
 - Sea Level rise is expected to exacerbate inundation, storm surge, erosion and other coastal hazards threatening vital infrastructure
 - By mid-century reduced water resources in many small island states



WMO

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)



UNEP

¿Qué podemos hacer? (I)

- ” Inercia del sistema climático → algunos cambios son inevitables → **actuación sobre los efectos** → **ADAPTACION**
- ” El calentamiento se produce por emisiones GEI → a más emisiones, mayor calentamiento → **actuación sobre las causas** → **MITIGACION** (cambio modelo energético, usos de suelo (deforestación), demografía, desarrollo sostenible, õ)
- ” Mejorar el conocimiento del sistema climático: **INVESTIGACION**

¿Qué podemos hacer? (II)

- “ **Actuación a diferentes niveles**: gobiernos, ciudades, individuos
- “ Aumentar el nivel de **concienciación del problema** → Influencia en la acción de individuos, ciudades, gobiernos.
- “ El problema del cambio climático está íntimamente **ligado a otros problemas** de la humanidad en su conjunto:
 - . pobreza (demografía),
 - . desarrollo sostenible,
 - . modelo energético,
 - . patrones de producción y consumo,
 - . comercio
 - . etc

Conclusiones

- “ Calentamiento **INEQUIVOCO** del sistema climático
- “ Muchos sistemas naturales **YA** están siendo afectados
- “ Calentamiento observado muy probablemente (90%) por aumento **antropogénico de GEI**
- “ Comprensión más sistemática del **ritmo y magnitud de los impactos** según la magnitud del calentamiento
- “ Identificados los sectores y regiones más **vulnerables**
- “ La inercia del sistema climático hace que algunos efectos duren siglos y milenios → **ADAPTACION**
- “ Capacidad de adaptación relacionada con **DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL** e irregularmente distribuida entre y dentro de las sociedades
- “ Evidencias de un gran potencial de **MITIGACION** de las emisiones de GEI con un amplio abanico de tecnologías de mitigación comercialmente disponibles ahora y en el plazo medio, suponiendo que los adecuados incentivos se ponen en marcha
- “ La **ACCIÓN EN EL CORTO PLAZO ES FUNDAMENTAL** para lograr objetivos de estabilización en plazos largos
- “ Relación biunívoca entre **CAMBIO CLIMATICO** y **DESARROLLO SOSTENIBLE** → **MARCO INTEGRADO** para el problema del cambio climático


Resumen

- ” Existe un **inequívoco calentamiento del sistema climático que continuará en mayor o menor medida dependiendo de las emisiones futuras de GEI**
- ” Gran potencial de **adaptación y mitigación → acción urgente**


Los impactos del cambio climático recaen desproporcionadamente sobre los países en desarrollo y sobre la población pobre



Bibliografía básica




<http://www.ipcc.ch>



<http://www.marm.es>

INTO 22/10/2008

<http://www.aemet.es>



Evaluación Preliminar
de los Impactos en España
por Efecto del Cambio Climático

